

Včelařský rok

Známe rok kalendářní, fenologický a jiný nás zajímá rok včelařský, který má 7 období.

A. Fenologické rozdělení včelařského roku

Rozvoj včelstva jde v souladu s rozvojem přírody, s rozvojem vegetace. Tuto zákonitost musí včelař respektovat. Pojem zralé včelstvo. Rostliny nám pomáhají odhadnout stav přírody, rozeznáváme dva typy:

1. Včelařské rostliny vůdčí – svým rozkvetem charakterizují nástup jednotlivých vývojových fází včelařského období roku.

2. Včelařské rostliny signalizační - oznamují že za 40 dnů rozkvetou rostliny hlavní.

- I. **Podletí** – VII-VIII.- období žní , máta, šalvěj, slunečnice, štírovník, druhá seč jetele, vrbovka, vřes a možná jedle. (ženci na pole včely s pole). Včelař-odstranění medníků, zužitkování matek, podzimní prohlídky, doplnění zásob, léčení. Včely-vyhánění trubců, slídění, loupež
- II. **Podzim** – IX-X.- ocún jesenní, rudbekia, světlík, astry. Včelař-poslední prohlídky, léčení třídění souší. Včely-náznaky chomáče na noc, prolety přes den.
- III. **Zima** – XI-II.- Bez vegetace. Včelař-údržba, hodnocení studium. Včely-zimní chomáč, klid.
- IV. **Předjaří** – III-IV.- olše
lepkavá, líska, šafrán, topol, jíva, podběl, bledule, sněženky, sasanka, plicník, hluchavka nachová. Včelař-jarní prohlídky, spojování, náprava, léčení. Včely-prolety, začátek plodování.
- V. **Jaro** – IV-V. Třešeň ptačí, srstka, ovocné stromy, kaštan koňský, bříza, trnka, buk, dub, řepka. Včelař-rozšiřování, kočování, vytáčení, CH M. Včely-rychlý rozvoj, jarní snůška často hlavní snůška, RN, stavební pud.
- VI. **Časné léto** – VI. Akát, rybíz, maliník, jetel, luční květiny, – les? Včelař-CH M, st. rámeček, rojení, vytáčení Očekávání, Včely- vrchol rozvoje, rojení, snůška
- VII. **Plné léto** – VII. – lípa malolistá, zimolez, pámelník, ohnice, hořčice, hadinec, mák, chrpa, svazenka, komonice. Atd. Včelař medobraní x krmení, konec slibům a radostem. Včely-slunovrat znamená přípravu na zimu.

Toto je členění uváděné ve všech učebnicích

Můj názor ale je že příští včelařský rok začíná ne v podletí, ale v časném létě, lépe řečeno na přelomu května a června.

Chováme matky a tvoříme oddělky a smetence, které z této doby vytvoří nejen silná včelstva do zimy, ale prověříme si i mladé matky.

B. Podle výrobních cyklů, včelařských období:

1. Regenerační období - podletí a podzim
2. Období zimního klidu – zima
3. Období jarního růstu – předjaří a jaro
4. Reprodukční a produkční období – časné léto a plné léto

System 5P:

1. Prostředí
2. Pastervní podmínky (plynulý pás potravy)
3. Příbytek
4. Plemeno
5. Potřebná péče včelařem.